



Hémophagocytose lympho-histiocytaire chez le sujet âgé : étude monocentrique de douze observations

1^{er} Auteur : Maha, Rebai, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis

Autres auteurs, équipe:

Ibrahim,Arbaoui, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis.

Mehdi, Somai, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis .

Fatma, Daoud, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis .

Zohra, Aydi, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis.

Fatma, Boussema, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis.

Besma, Ben Dhaou, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis .

Imène, Rachdi, Service de médecine interne, hôpital Habib Thameur, Tunis

Introduction ; La lymphohistiocytose hémophagocytaire (LHH) est une pathologie grave avec activation incontrôlée des lymphocytes et macrophages, entraînant une tempête cytokinique. Chez les sujets âgés, le diagnostic est compliqué par les modifications physiologiques séniles et les atypies clinico-biologiques.

Méthodes:

-Durée d’étude : 8 ans

-Critères d’inclusions : âge >65 ans + critères de l'Histiocyte Society 2004.

	Résultats
Population étudiée	✓ 11 patients ; sex-ratio H/F = 0,36 ✓ âge moyen de 80 ans (extrêmes : 66–86 ans)
Anomalies biologiques	✓ Anémie : 9 cas (Hb moyenne : 7,7 g/dL) ✓ Leucopénie/neutropénie : 5 cas ; ✓ hyperferritinémie/hypertriglycérémie : 5 cas ; ✓ thrombopénie : 4 cas
Étiologies	✓ Causes infectieuses : 8 cas (COVID-19 : 3, CMV : 3, staphylocoque : 1, tuberculose : 1) ; ✓ Maladie de Horton : 1 cas * Cause ✓ iatrogène : 1 cas ; * ✓ Etiologie indéterminée : 1 cas
Traitements	✓ Corticothérapie : 5 patients ✓ Etoposide : 3 patients

Conclusion ; La HLH, encore sous-estimée chez les sujets âgés, est une urgence diagnostique et thérapeutique par excellence imposant une prise en charge rigoureuse. chez les sujets âgés la LHH complique le plus souvent de diverses maladies infectieuses comme le montre notre étude. Une approche thérapeutique précoce et spécifique chez ces patients est recommandée afin d’améliorer la survie.