



Profil épidémiologique, clinique et étiologique des fièvres prolongées d’origine non infectieuse dans un service de maladies infectieuses

1^{er} Auteur : Asma, Hajri, Résidente en médecine , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Lobna, Saad, Assistante hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Wafa, Marrakchi,professeur agrégé , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Mariem, Abdeljelil, Assistante Hospitalo-universitaire , , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Abir, Aouam, professeur hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Hejer,Ben brahim, professeur hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Foued,Ben romdhan , professeur hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Adnen, Toumi , professeur hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

-Chaouki,Loussaief, professeur hospitalo-universitaire , Service de maladies infectieuses , CHU Fattouma bourguiba , Monastir , Tunisie

Introduction :

La fièvre prolongée constitue un motif fréquent d’hospitalisation en maladies infectieuses. Si les causes infectieuses demeurent prédominantes, une proportion non négligeable des fièvres prolongées est liée à des étiologies non infectieuses, posant parfois des difficultés diagnostiques.

Objectif :

Décrire le profil épidémiologique, clinique, paraclinique et étiologique des patients présentant une fièvre prolongée d’origine non infectieuse.

Matériels et méthodes :

Étude rétrospective incluant tous les patients hospitalisés au service des maladies infectieuses de Monastir entre 2010 et 2025 pour fièvre prolongée d’origine non infectieuse. Les données démographiques, cliniques, paracliniques et étiologiques ont été recueillies à partir des dossiers médicaux.

Résultats :

Données épidémiologiques :

- N = 40 patients
- le sexe ratio (H/F) = 1
- Age médian : 47 ans

Données cliniques : La durée moyenne d’évolution de la fièvre avant hospitalisation:6 semaines [1–26 semaines].




Figure 1 : Les principaux signes fonctionnels




Figure 2 : Les principaux signes à l’examen physique

Les anomalies biologiques :




Figure 3 : Les principales anomalies biologiques

Les principales étiologies:




Figure 4: Les principales étiologies de fièvre prolongée chez nos patients

Conclusion :

Ces résultats mettent en évidence la grande hétérogénéité clinique, biologique et étiologique des fièvres prolongées d’origine non infectieuse, soulignant la nécessité d’une approche diagnostique structurée et multidisciplinaire.