



Pneumopathies interstitielles diffuses chez le sujet âgé : étude rétrospective à propos de 120 cas.

- Chaima, Zammel, Résidente, Service de médecine interne, Hôpital régional de Ben Arous,Ben Arous, Tunisie
- Donia,Chebbi, Assistante Hospitalo universitaire Service de médecine interne, Hôpital régional de Ben Arous,Ben Arous, Tunisie
 - Fatma,Ben Dahmen médecin spécialiste, Service de médecine interne, Hôpital régional de Ben Arous,Ben Arous, Tunisie
 - Meya, Abdallah, Professeur, Service de médecine interne, Hôpital régional de Ben Arous,Ben Arous, Tunisie

Introduction

Les pneumopathies interstitielles diffuses (PID) du sujet âgé sont dominées par la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
Néanmoins d’autres étiologies peuvent être observées dans cette population.
L’objectif de notre étude était de décrire les caractéristiques cliniques, radiologiques et étiologiques des PID chez les patients âgés.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée dans un service de Médecine Interne, incluant tous les patients âgés ≥ 65 ans pris en charge pour une PID.

Résultats :

Parmi 248 patients suivis pour une PID, 120 (48,3 %) étaient âgés de 65 ans ou plus. (Tableau 1)
Tous les patients étaient symptomatiques. (Figure 1)

Population étudiée	N(%)
Femme	61 (50,9%)
Homme	59 (49,1%)
Sex ratio	1,03
Age moyen	78 ans
Tabagisme	59 (49,1)
Antécédent familial de PID	4

Tableau 1 caractéristique épidémiologiques

➤ TDM thoracique : le pattern le plus fréquent = **PIC** (Tableau 2).

Pattern scanner	N(%)
PIC	55 (45,9%)
PINS	28 (23,3%)
PO	5 (4,2%)
PINS-PO	1 (0,9%)
PHS	2 (1,7%)
Sarcoïdose	2 (1,7%)
Pattern non précisé	27 (22,3%)

Tableau 2 : Patterns scannographiques

➤ Les explorations fonctionnelles respiratoires révélai ent un syndrome restrictif mod  r   (Tableau 3)

Param��tre ��tudi��	Valeur moyenne
CVF	76%
CPT	78%
DLCO	57,5%

Tableau 3 : Donn  es des explorations fonctionnelles

➤ Une origine secondaire   tait trouv  e dans environ un tiers des cas (Figure 3).




Figure 1 : Signes cliniques respiratoires




Figure 3 : Profil   tiologique

- Un traitement a   t   instaur   chez 77 patients: La corticoth  rapie et/ou les immunosuppresseurs.
- Le nint  danib a   t   utilis   dans deux cas et une bioth  rapie dans un cas.

Conclusion

- ❖ Dans cette s  rie, plus d’un tiers des PID du sujet   g   n’  taient pas li  es    une FPI.
- ❖ Ces donn  es soulignent que l’  ge avanc   ne doit pas conduire    pr  sumer une   tiologie idiopathique et justifie un bilan   tiologique syst  matique.