



Les uvéites au cours de la maladie de Behçet

Amira, Atig, Professeur agrégée, Médecine interne, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

- Abdejilil, Barhoumi, Interne, Médecine interne, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- Ilhem, Sallem, AHU, Ophtalmologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- Ali, Dhoubi, Interne, Médecine interne, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- Amal, Baya Chatti, AHU, Médecine interne, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- Ahmed, Mahjoub, Professeur agrégé, Ophtalmologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- Neirouz, Ghannouchi, Professeur, Médecine interne, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

Introduction :

La maladie de Behçet (MB) est une vasculite occlusive de cause inconnue qui peut affecter les vaisseaux de tout calibre et se manifestant par des poussées itératives. Elle touche différents organes notamment les yeux. L’uvéite constitue l’atteinte oculaire la plus fréquente. Elle pose plusieurs problèmes en pratique courante à cause de son polymorphisme clinique, la difficulté de sa prise en charge et son pronostic variable. Ainsi, nous avons élaboré cette étude qui a pour objectifs de décrire les caractéristiques cliniques de l’uvéite au cours de la MB et ses différentes complications oculaires et de démontrer l’apport de l’imagerie multimodale oculaire dans le diagnostic .

Patients et méthodes :

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective à partir des dossiers des patients atteints de MB avec uvéite et suivis dans les service d’ophtalmologie et de médecine interne du CHU Farhat Hached de Sousse durant la période allant du 31/12/2017 au 31/02/2024. Nous avons inclus le patients ayant des uvéites et répondant aux critères de la MB selon International Criteria for Behçet's Disease

Résultats :

Nous avons examiné 86 dossiers de patients ayant une uvéite liée à la MB dont 54 dossiers (91 yeux) ont été retenus .Notre série comportait 36 hommes (66,7%) et 18 femmes (33,3%) soit un genre-ratio égal à 2. L’âge moyen de nos patients à la première visite en ophtalmologie était de $36,89 \pm 14,48$ ans [12 - 66 ans]. L’angiographie à la fluorescéine était l’examen complémentaire le plus réalisé et avait montré principalement une vasculite rétinienne (82 yeux). La Tomographie en cohérence optique réalisé dans 43 yeux (47,25%), avait permis d’objectiver un OM dans 18 yeux. Des anomalies de l'OCT-Angiographie pratiqué chez 21 yeux, avait montré une rupture de l’arcade vasculaire péri-fovéale dans 6 yeux . Les complications de l’uvéite de la MB étaient notées dans 54 yeux. Il s’agissait de synéchies postérieures dans 42 yeux et d’OM dans 28 yeux. Un stade terminal a été objectivé dans 6 yeux.

Conclusion :

Les résultats de notre étude concordent avec ceux des autres séries publiées. Bien que la MB soit rare, ses manifestations ophtalmologiques sont fréquentes et graves D’où l’intérêt de la détection précoce des signes oculaires en particulier de l’uvéite, dont la chronicité et la sévérité peuvent engager le pronostic visuel.

