



PROFIL HÉMATOLOGIQUE ET GOUTTE : INTÉRÊT DES RATIOS CELLULAIRES

1^{er} Auteur : Yesmine, BELLACHHEB, résidente, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
Autres auteurs, équipe:

- Zouhour, GASSARA, AHU, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Afef, FEKI, MCA, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Samar, BEN JEMAA, MCA, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Mariem, EZZEDINE, Spécialiste, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Mohamed Hedi, KALLEL, Professeur, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Sofiene, BAKLOUTI, Professeur, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Hela, FOURATI, Cheffe de service, Rhumatologie, Hôpital Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE

Introduction:


La goutte est une arthropathie inflammatoire fréquente, dont l’expression clinique peut être très variable. L’évaluation de l’inflammation systémique chez ces patients reste parfois complexe, surtout en présence de comorbidités ou chez le sujet âgé. Parmi les marqueurs hématologiques, le rapport plaquettes/lymphocytes (PLT/L) et le rapport neutrophiles/lymphocytes (PNN/L) ont récemment été étudié dans diverses maladies inflammatoires comme un indicateur potentiel de l’intensité de l’inflammation. Cette étude vise donc à explorer les rapports PLT/L et PNN/L comme outils potentiels pour mieux caractériser le profil inflammatoire chez les patients gouteux.

Patients et méthodes:



Etude rétrospective et analytique .
Patients suivis pour goutte au sein du service de rhumatologie de l’hôpital Hedi Chaker en Tunisie.
Pour chaque patient, nous avons recueilli les données démographiques, cliniques, biologiques et radiographiques. Les rapports PLT/L et PNN/L ont été calculé à partir des valeurs plaquettaires, granulocytaires et lymphocytaires extraites de l’hémogramme.

Résultats :



Conclusion :

Les rapports hématologiques PNN/L et PLT/L semblent refléter l’intensité de l’inflammation chez les patients gouteux. Le rapport PLT/L est associé à l’âge et aux marqueurs inflammatoires, tandis que le rapport PNN/L est corrélé aux déformations osseuses et aux marqueurs inflammatoires. Ces résultats suggèrent que ces ratios pourraient constituer des indicateurs simples et complémentaires pour évaluer le profil inflammatoire et le risque de complications chez les patients atteints de goutte.