



Eruption papuleuse des zones photoexposées révélant une « leukemia cutis »

1^{er} Auteur : Kmar, TURKI, Interne, Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE


- Rim, CHAABOUNI, Assistante, Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Dora, ZGHAL, Interne, Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Sonia, BOUDAYA, Professeur, Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE
- Hamida, TURKI, Chef de service, Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, TUNISIE

Introduction and objectifs

La leucémie cutanée ou « leukemia cutis » (LC) correspond à une atteinte de la peau chez des patients présentant une leucémie périphérique ; elle est relativement rare et témoigne généralement d’un stade avancé de la maladie. Nous rapportons un cas de « leukemia cutis » particulier par sa présentation aiguë en zones photoexposées.

Cas clinique

- Femme, 51 ans
 - Suivie pour une leucémie lymphoïde chronique (**LLC**) **CD20+** diagnostiquée depuis un an
 - Traitée par **chimiothérapie** (adriamycine, vincristine, cyclophosphamide et rituximab), avec une réponse métabolique partielle → **surveillance active**.
 - Depuis **20 jours** : Eruption **papuleuse** érythémateuse, par endroits lichénoïde, prurigineuse, siégeant aux **zones photo-exposées** (visage, avant-bras, dos des mains).
 - **Dermoscopie** : vaisseaux en point, fond d'érythème et stries blanchâtres.
 - **Adénopathie** axillaire volumineuse et deux adénopathies cervicales centimétriques.
 - **Biologie** : taux de lymphocytes normal, avec une hyperéosinophilie dépassant 1000 éléments/mm3 fluctuante.
 - **Biopsie cutanée** : nodules dermiques lymphocytaires exprimant CD20, CD5 et CD23.
- ➔ **Diagnostic retenu : localisation cutanée de son LLC.**



Discussion

