



PROFIL CLINICO-BIOLOGIQUE ET ÉVOLUTIF DES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES ASSOCIÉES AUX CONNECTIVITES

Auteurs : H. Kchir, M. Boussabon, T. Ben Achour*, H. Yacoub, H. Hassine, D. Cherif, H. Dabbebi, M. Smiti*, N. Maamouri

Affiliations : Service de gastro-entérologie B La Rabta, Tunis, Tunisie

* Service de Médecine interne La Rabta, Tunis, Tunisie



1. INTRODUCTION

Les hépatites auto-immunes (HAI) et leurs syndromes de chevauchement s'inscrivent dans un contexte de poly-auto-immunité fréquemment associé à des connectivites systémiques. Il demeure controversé de savoir si ces comorbidités traduisent une atteinte hépatique plus sévère ou reflètent essentiellement un terrain auto-immun systémique renforcé. Cette étude vise à comparer le profil des principaux auto-anticorps entre HAI et syndromes de chevauchement et à analyser leurs associations avec le phénotype biologique et la sévérité hépatique.



2. OBJECTIFS

Déterminer la prévalence des connectivités associées aux hépatopathies auto-immunes (HAI Vs syndromes de chevauchement), et évaluer leur impact sur les caractéristiques cliniques, biologiques, immunologiques et sur la sévérité de la fibrose.



3. MÉTHODES

Étude rétrospective monocentrique incluant 63 patients suivis pour hépatopathie auto-immune (HAI, HAI-CBP, HAI-CSP). Les HAI isolée ou syndrome de chevauchement avec CBP, CSP ou les deux. Diagnostic des connectivités selon les critères ACR-EULAR.

Deux groupes : avec Vs sans connectivités associée.

Données recueillies : clinico-biologiques, immunologiques et histologiques. Analyses : Chi², Fisher et régression logistique binaire. Variables du modèle : âge, titre d'AAN, type d'atteinte hépatique.

4. COHORTE / RÉSULTATS GÉNÉRAUX



63 patients



27 HAI isolées (42,9 %)



36 syndromes de chevauchement (57,1 %)



Âge moyen : 50,98 ± 15,36 ans




Prédominance féminine : sex-ratio F/H = 4,7




14 connectivites associées (23,3 %)

5. CONNECTIVITES ASSOCIÉES

A) Répartition des connectivités



B) Prévalence selon le type d'hépatopathie



p = 0,918



La prévalence des connectivités était comparable entre HAI et syndromes de chevauchement.

6. IMPACT DES CONNECTIVITES



- Aucune association significative avec les paramètres cliniques et biologiques hépatiques
- Titres d'anticorps antinucléaires (AAN) plus élevés en cas de connectivite (p = 0,016)
- Association confirmée en analyse multivariée (p = 0,020)



- Biopsie hépatique réalisée chez 38 patients
- Fibrose avancée : 20 % avec connectivite Vs 28 % sans connectivite
- p = 0,699
- Absence d'impact sur la sévérité histologique

7. CONCLUSION



Près d'un quart des patients atteints d'hépatopathie auto-immune présentent une connectivité associée. Celle-ci ne semble pas associée à une sévérité hépatique accrue mais reflète davantage un terrain auto-immun systémique renforcé, indépendamment du type d'atteinte hépatique.

MESSAGE CLÉ



Les connectivites sont fréquentes mais ne majorent pas la sévérité de l'atteinte hépatique, elle s'associent surtout à des titres des AAN plus élevés.