



PROFIL DES AUTO-ANTICORPS ET SÉVÉRITÉ HÉPATIQUE DANS LES HÉPATOPATHIES AUTO-IMMUNES

Auteurs : H. Kchir, M. Boussabon, T. Ben Achour*, H. Hassine, H.Yacoub, D. Cherif, H. Dabbebi, M.Smiti*, N.Maamouri

Affiliations : Service de gastro-entérologie B La Rabta, Tunis, Tunisie

* Service de Médecine interne La Rabta, Tunis, Tunisie



1. INTRODUCTION

Les hépatites auto-immunes (HAI) et leurs syndromes de chevauchement présentent une hétérogénéité immunologique marquée. Le rôle des auto-anticorps dans la caractérisation phénotypique et la prédiction de la sévérité hépatique demeure débattu. Cette étude vise à comparer le profil des principaux auto-anticorps entre HAI et syndromes de chevauchement et à analyser leurs associations avec le phénotype biologique et la sévérité hépatique.



2. OBJECTIFS

Comparer le profil des principaux auto-anticorps entre HAI et syndromes de chevauchement et analyser leurs associations avec le phénotype biologique et la sévérité hépatique.



3. MÉTHODES

Étude rétrospective monocentrique incluant 60 patients suivis pour hépatopathie auto-immune (HAI, HAI-CBP, HAI-CSP). Auto-anticorps étudiés : AAN, AML, AMA2, anti-sp100, anti-gp210, anti-LC1, anti-LKM1. Données recueillies : biologie hépatique et élasticité hépatique (FibroScan). Fibrose avancée définie par F3–F4. Deux groupes : avec Vs sans connectivités associée. Analyses statistiques : Chi²/Fisher, Mann–Whitney et régression logistique multivariée.

4. COHORTE / RÉSULTATS GÉNÉRAUX



25 HAI (41 %)
35 syndromes de chevauchement (58 %)



Chevauchements majoritairement CBP–HAI (n = 28)



Âge moyen : 50,9 ± 15,3 ans




Femmes : 82 %



Fibrose avancée :
12 patients (20 %)

5. RÉSULTATS IMMUNOLOGIQUES



Les AAN et AML prédominent dans l'HAI, alors que les AMA2 et anti-gp210 caractérisent davantage les syndromes de chevauchement.



6. ANTI-GP210 ET SÉVÉRITÉ HÉPATIQUE

- Fibrose avancée : 50 % Vs 27 % (p = 0,04)
- Élasticité hépatique médiane : 12,5 Vs 8,6 kPa (p = 0,02)
- Analyse multivariée : OR 2,8 ; IC95% 1,1–7,5 ; p = 0,03



La positivité des anti-gp210 demeure indépendamment associée à la fibrose avancée.

7. CONCLUSION



Le profil des auto-anticorps distingue clairement HAI et syndromes de chevauchement. Les AMA2 traduisent un phénotype cholestatique, tandis que les anti-gp210 apparaissent associés à une fibrose plus avancée, suggérant un potentiel rôle pronostique. Compte tenu du caractère rétrospectif et de l'effectif limité, ces résultats nécessitent confirmation dans des cohortes prospectives plus larges.

MESSAGE CLÉ



Le profil auto-immun distingue HAI et chevauchement ; la positivité des anti-gp210 est un élément de mauvais pronostic.