



Profil des uvéites infectieuses : Contraste clinique, étiologique et évolutif

Hind,STITOU, interne, Médecine Interne, CHU Mohamed VI, Tanger, Maroc
Soumaya, EL BACHIRI, professeur assistant, Médecine interne, CHU Mohamed VI, Tanger, Maroc
Wyssal, CHAWAD, professeur assistant, Médecine interne, CHU Mohamed VI, Tanger, Maroc
Myriem Bourkia, professeur , Médecine interne, CHU Mohamed VI, Tanger, Maroc

Introduction :





L’uvéite est une inflammation intraoculaire aux présentations variées. Les **uvéites infectieuses** constituent une entité particulière, caractérisée par la diversité de leurs manifestations cliniques et de leurs agents causaux

Matériels et méthodes :


Etude rétrospective descriptive menée au service de Médecine Interne et Immunologie clinique du CHU de Tanger, Maroc, entre Janvier 2019 et Janvier 2026, incluant des patients suivis pour uvéite infectieuse. L’objectif était d’analyser leurs caractéristiques selon le statut immunitaire : Immunocompétent (IC) ou Immunodéprimé (ID).

Résultats :

- 16 cas d’uvéite infectieuse. L’âge moyen des patients était de 36 ans, dont 9 hommes et 7 femmes.
- 11 présentaient une immunodépression sous-jacente , liée au VIH dans 10 cas, et iatrogène dans 1 cas . 5 patients étaient immunocompétents.



**Image 1 : Fond d’œil :
nécrose rétinienne évolutive
(CMV)**



**Image 2 :Fond d’œil :
séquelles cicatricielles de
rétinite infectieuse**

Discussion et conclusion :

Notre étude met en lumière deux profils contrastés : chez les immunodéprimés, les uvéites infectieuses sont dominées par des germes opportunistes (CMV, tuberculose), révélées par une symptomatologie souvent frustrante et associées à un pronostic défavorable, tandis que chez les immunocompétents elles se présentent avec des signes francs, des étiologies classiques (syphilis, zona, tuberculose) et une évolution favorable.

Ces résultats, comparés à la série de N. Jait et al.(1), confirment que les **étiologies diffèrent selon le statut immunitaire**, soulignant la nécessité d’un diagnostic précoce pour améliorer le pronostic visuel et vital en contexte d’immunodépression.