



Évaluation de la relation médecin-patient chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et facteurs associés

Leila Rouached, Salma. Loukil ,. Lina .ben Slimen ; Saidane. Olfa ; Siwar. Ben Dhia ; Bouden. Selma ; Mamhmoud Ines ; Rawdha.Tekaya ; Ben Tekaya. Aicha ; Leila Abdelmoula

Service de Rhumatologie, Hôpital Charles Nicolles, Tunis, Tunisie

Introduction

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est RIC qui entraîne un retentissement fonctionnel important. Sa prise en charge efficace repose sur une approche globale associant traitements pharmacologiques, suivi régulier et implication active du patient. Malgré les avancées thérapeutiques, l’adhésion au traitement demeure un défis majeur. Ces résultats sont influencés par de multiples facteurs, dont la qualité de la relation médecin–patient constitue un déterminant essentiel.

Objectifs

L’objectif de notre étude était d’évaluer la relation patient médecin dans la PR et identifier les facteurs influençant cette relation.

Méthodes

- Etude transversale mono centrique
- Patients suivis pour PR.
- Les données sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques ont été transcrites.
- La relation médecin-patient a été étudiée : questionnaire PEPPI (Perceived Efficacy in Patient–Physician Interactions) → 5 questions avec un score allant de 0 à 25, Un score total élevé reflète une plus grande efficacité perçue de la relation médecin-patient.
- seuil de signification a été fixé pour un p<0,05.

Résultats

